


CÓMO INICIAR UN IV

10 PASOS UTILIZANDO UNA INFUSIÓN DE MARIPOSA



1

Reuna los suministros; retire cualquier articulo necesario del refrigerador y permita que el diluyente esteril alcance temperature ambiente si es

2

Lavese las manos o use alcohol de gel.

3

Uno de los pasos mas importantes en este proceso es encontrar la vena adecuada para insertar la aguja. La vena grande localizada donde se dobla el codo es la mas usada, pero tambien se pueden usar las

4

Ponga un torniquete unas cuantas pulgadas arriba del sitio de acceso, de manera que se pueda quitar facilmente despues de insertar la aguja mariposa. (para ayudar a visualizar el sitio de acceso, puede golpear ligeramente la piel y apretar el puño algunas veces)

5

Asegurece que la vena es segura y limpie el area con una toallita de alcohol (frote por 30 segundos y permita otros 30 segundos para que se seque)

6

Escoja el tamaño de la aguja mariposa.

7

Con cuidado retire la tapa de la aguja, y apretadamente estire la piel alrededor del sitio de acceso intravenoso. Mantenga la aguja lo mas paralelo a la piel posible e insertela en la vena. Un poco de sangre en el tubo de la aguja le indicara que la vena fue inyectada directamente, puede continuar insertando la aguja.

8

Retire el torniquete.

9

Ponga atencion a escapes o inflamacion en el sitio intravenoso. Si esto ocurre, el proceso fracaso.

10

Ahora esta listo para la administracion del medicamento. (Asegurece de seguir las instrucciones sobre como desechar suminitros apropiadamente)

*all images are a copyright of
World Federation of Hemophilia*



HOW TO START AN IV

10 STEPS USING A 
BUTTERFLY INFUSION SET

1

Gather supplies; remove any items from the refrigerator and allow the sterile diluent to come to room temperature if applicable.



2

Wash hands or use alcohol gel.



3

The important step in the process is to find a good vein to access the IV. The large vein located in the bend of the elbow is most often used, but you can also use hand, and wrist if necessary.



4

Apply a tourniquet just a few inches above the site, securing it for easy removal after inserting the butterfly. *(To help visualize the access site, tap the skin of the IV and squeeze the fist a few times.)*



5

Make sure that the vein is secure and wipe the area with an alcohol pad. *(30 seconds rub with friction and allow to dry for 30 seconds)*



6

Choose a butterfly size. *(For example: 23, 25, or 27 gauge)*



7

Remove cap on butterfly and tightly pull skin around IV site. Keep butterfly as parallel to skin as possible and insert needle. A hint of blood in butterfly tubing indicate vein was hit directly. Continue to advance butterfly.



8

Remove the tourniquet.



9

Look for leaking and swelling at the IV site. If this occurs, the process was unsuccessful.



10

Now ready for administration of medication. *(Make sure to follow guidelines to properly dispose of your supplies.)*

*all images are a copyright of
World Federation of Hemophilia*



WFH